

## Dyrkningsvejledning for Aubergine



Latinsk navn: *Solanum melongena*

*Aubergine er en tropisk busk som bliver op til 75 cm høj med en bredde på ca. 60 cm. Planten har behårede blade og stilke. Den er vanskeligere at få til at lykkes i haven end tomater og peberfrugter (som er den samme familie), sandsynligvis fordi der ikke har været det store avlsarbejde for at få sorter som vokser godt i vores kølige klima. Derfor er det bedst at dyrke aubergine i drivhus, og det er helt klart en plante som kan give stor glæde når det lykkes og man ønsker lidt udfordring i sit arbejde med grøntsagsdyrkning.*

### **Jord:**

Auberginer kræver dybt bearbejdet og frugtbar jord.

**Forkultivering:** Dyrkes i spirepotter på 5 cm, og ompottes til 9 cm- og 13 cm-potter hvis det bliver nødvendigt (i et koldt forår). Frøene sås i næringsberiget sphagnum og gerne så tidligt som muligt i vindueskarmen (midt i marts), da de er utrolig langsomt-voksende. Spiringstemperaturen skal være 21-30 °C. Det tager ca. 2 måneder fra såning til udplantning og man bør omplante et par gange i denne periode.

### **Udplantning:**

Efter spiring kræver planterne mindst 16 °C om natten og 18 °C om dagen for at holde sig i vækst. Plant ud i drivhuset i slutningen af april til begyndelsen af maj eller udendørs under glaskupler efter den sidste forårsfrost. Afstand mellem planterne skal være 50 cm og det samme mellem rækkerne. Det kan anbefales at dyrke dem i krukker på mindst 10-15 liter, da dette giver mulighed for at flytte rundt på dem.

### **Pleje:**

Der vandes i hele perioden med gødningsvand tilsat 1 promille flydende gødning. Aubergineplanten bliver meget busket og ikke særlig høj, og den bindes op ved hjælp af 4 kraftige stokke, hvorpå grenene fastbindes. Grenene med frugter kan brække, hvis de ikke bindes op. Planten er selvbestøvende.

### **Beskæring:**

Toppen skæres af, når der er 5 - 6 blade, hvilket sikrer at planten bliver busket. Desuden udtyndes planten, så der kommer lys og luft til den.

### **Høst:**

Når frugten har fået auberginefarve, høstes den. Frugterne skal ikke blive for store, da det mindsker den samlede høst.

### **Skadedyr:**

Bladlus er absolut aubergineplantens værste fjende. Lusene kan ses med det blotte øje, og der kommer huller i bladene på planten. Når angrebet er sket, kan planten overbruses med vand, og der kan sprøjtes vand på planten under bladene. Hermed forsvinder mange lus. En anden mulighed er at indfange mariehøns, som udsættes på planten i drivhuset. De elsker bladlus, og får hurtigt sat skik på en koloni af bladlus.

Spindemider er en mindre trussel for aubergineplanten. Miderne, som sidder på bagsiden af bladet, er meget små, og har en rødlig farve. Angrebet ses ved at bladene først får små gule pletter, som bliver større og større, for til sidst at visne helt. Hvis der ikke bliver grebet ind, dør planten. Spindemider bekæmpes med rovmider, som er et biologisk bekæmpelsesmiddel. Rovmiderne æder såvel æg som spindemiderne.

Mellus, som også kaldes hvidefluer, er nogle små hvide insekter med vinger, der er lette at se, hvis man vifter til planten. De sværmer rundt. Hvide fluer kan undgås ved grundig rengøring af drivhuset hvert år. Hvis man har fået hvide fluer, kan disse bekæmpes med snyltehvepse, som er et biologisk bekæmpelsesmiddel.