

## Dyrkningsvejledning for Hvidkål



Latinsk navn: Brassica oleracea var. Capitata

### Jord:

Det danske klima egner sig godt til hvidkål. Det må gerne være blæsende for at undgå store skadedyrsangreb, især kålsommerfuglen kan være et problem. Kystnære områder skulle, give en længere vækstsæson, da der er færre døgn med nattefrost. Hvidkål kan dyrkes på alle jorder, blot der er god forsyning med næringsstoffer og vand. Disse krav opfyldes bedst på en lerholdig jord. Det er en fordel at forberede pladsen hvor hvidkålen skal stå med et lag kompost eller beriget spagnum. Da kål optager en masse næringsstoffer for at udvikle store hoveder, skal det såkaldte reaktionstal være ret højt, det vil sige at man skal kalke jorden lidt om foråret, men ikke for meget, for et for højt reaktionstal øger risikoen for kålbrok.

### Forkultivering:

Hvidkål sås indendørs i koldhus i april og de plantes ud når frosten er ovre. Så 2-3 frø i en 9 cm potte med humusrig og velgødet jord. Forkultivering giver mulighed for at holde dine planter unde opsyn og forhindre at de blive gnavet ned af skadedyr.

### Udplantning:

Svage planter tyndes ud og der udplantes på friland i juni måned. Jorddække kan udlægges samtidig med.

### Direkte udsåning:

På friland sås fra midt i april. Man sår 3-4 frø, hvor man ønsker én blivende plante. Den direkte såning giver risiko for at kimplanterne ødelægges af forskellige skadedyr som jordlopper eller snegle, så hvis man er plaget af disse, er det bedre at udplante og samtidig udlægge et godt lag jorddække.

### Pleje:

Vand er nødvendig for at sikre god vækst og dermed hoveddannelse. Hvis hvidkålsplanterne tørke-stresses i vækstperioden bliver hovederne små. Det er derfor en god ide at lægge et godt lag jorddække eller dug omkring planterne, som kan nedsætte fordampningen fra jordoverfladen.

### Høst:

Kålhovederne kan holde sig længe og de høstes typisk i det sene efterår hvor det er koldt i vejret, men inden det sætter ind med hård frost.

**Sygdomme:**

- *Kålbrot* er den største risiko ved hvidkålsdyrkning, dette kan forbygges ved at holde et godt sædskifte. Der skal gå 5 – 6 år mellem hver gang man dyrker kål samme sted, og det betyder at man i en lille have må undvære at dyrke kål nogle år.

- *Kålsommerfuglen* finder på at lægge sine æg i hvidkålen. Man kan forebygge en del ved at plante duftende blomster omkring den, fx tagetes. Man kan også dyrke under net, men så skal de være effektive og tætte. En god ide er også at sætte redekasser op til småfuglene som kan spise larverne.

- *Snegle*: Kimplanterne er særligt følsomme for angreb af f.eks. snegle som kan æde hele planter på en enkelt nat.