

Dyrkningsvejledning for Pastinak



Latinsk navn: *Pastinaca sativa*

"Pastinak hører til skærmplantefamilien ligesom gulerødder og persillerod. Første år udvikler pastinakken sin hvide hovedrod, og andet år fremkommer blomsterskærmen. Kan du lide pastinakker, er det en god ide at dyrke dem selv, da de giver et stort udbytte af friske rødder som man kan høste fra midt i september og helt frem til februar. Pastinakker mister hurtigt sprødheden når de er gravet op - så vil du have friske pastinakker så dyrk dem selv. Det er vigtigt at pointere at bladene på pastinak ikke kan spises ligesom de kan på persillerod."

Jord:

Pastinak kan dyrkes på både sandjord og lerjord og jordtyper derimellem, men en lerholdig og dybmuldet jord er at foretrække. Pastinak kræver en veldrænet og dybtbearbejdet jord, der helst skal være løsnet ned i 30 cm dybde. Jorden må helst ikke indeholde alt for mange sten og være hård, da det kan give grenede rødder. pH-værdien bør ligge omkring 6,5–7,5.

Direkte udsåning:

Pastinak sås sidst i april eller først i maj. Frøene kan spire allerede ved 4° C, men den optimale temperatur er 10–20° C. Da spiretiden er lang, 16–28 dage, så er det en god ide at vente til jordtemperaturen er optimal. Lav 1–2 cm dybe riller i løs jord med en afstand på 30-35 cm. Så frøene så fint som muligt og uddynd senere til en planteafstand på 10-12 cm. Afstanden mellem planterne i rækken betyder en del for hvor store rødderne bliver; står de alt for tæt, bliver rødderne for små, er der meget stor afstand, får man nogle kæmperødder. Pastinakfrø har let ved at miste spireevnen, så brug nyindkøbte frø.

Pleje:

Hold bedet rent for ukrudt de første uger, senere skal pastinakkerne nok klare sig i forhold til de mindre ukrudstarter når de store blade overvokser ukrudtet. Når planterne er 15 cm høje er det en god ide at udlægge jorddækning, det hjælper til at holde jorden fugtig. Undgå at gøde dine pastinakker for kraftigt da planten bruger næringen til bladvækst i stedet for rodvækst.

Høst:

Pastinakker kan man begynde at høste af fra midt i september, når man synes de er blevet store nok. Den skades ikke af frost og kan blive stående i jorden hele vinteren uden dække. Det kan dog være en fordel at dække rækken med blade eller halm, så man kan grave rødder op i frost. Ved udsigt til en længere frostperiode er det en god ide at grave en portion op til nogle ugers forbrug.

Sygdomme:

Generelt angribes pastinak ikke særlig meget af sygdomme. Dette forudsætter dog, at man holder et godt sædskifte med 4-5 år mellem skærmpflanter. Pastinak angribes af næsten de samme sygdomme som gulerødder. Derudover kan pastinak angribes af *Itersonilia pastinacae* - en svamp, der danner aflange sår på skuldrene af pastinakken. Sårene er sorte eller mørkt lilla.