

## Dyrkningsvejledning for Peberfrugt



Latinsk navn: *Capsicum annuum* L

*"Dyrkning af peber kræver tålmodighed - der går nemlig noget der ligner 2 måneder fra såning til udplantning. Dog skal dette ikke afskrække drivhusejeren fra at dyrke peber, og dermed undgå at opleve den fantastiske smag og farve fra en nyplukket frugt. Smagen fra frugterne strækker sig fra den søde, meget sprøde peberfrugt til den stærke lidt seje chili. Man skal ikke regne med at det er muligt at dyrke peberfrugt på friland."*

### Jord:

Brug pottemuld til dyrkning af peberfrugter

### Forkultivering:

Peber for kultiveres altid. Peber sås i små potter fyldt med en almindelig såjord. Spiretemperaturen er 25 - 30 grader, og der går ca. 10 dage før de spirer. Når de har nået en vis størrelse, plantes de om i 10 cm potter.

### Udplantning:

Peber kan plantes direkte i bedet, men vær opmærksom på, at den kan blive ca. 1 m høj og meget busket med grene til alle sider. Planten skal bruge mere plads, end man umiddelbart skulle tro. Det bedste er dog at plante peberfrugten i en beholder på 10-15 liter. Hermed sparer man på drivhuspladsen i starten. Samtidig giver det en mulighed for at flytte planterne på friland i de varmeste perioder og nemmere bekæmpe luse-angreb ved at bruse lusene af med en vandstråle.

### Pleje:

Planterne kræver en jævn vandig gennem hele væksten, men er meget nøjsomme med hensyn til gødning. Anbefalingen er at planten vandes med 1 promille gødningsvand når den står i potter. For at undgå at planten vælter, placeres en stok i "midten" af planten som støtter den. Peberplanten har sprøde grene, og det kan blive nødvendigt at understøtte grenene når frugterne vokser sig store så de ikke knækker. Peber er selvbestøvende, men det er dog en fordel at ryste planterne under blomstringen for at sikre bestøvningen.

### Beskæring:

Det er særdeles vigtigt at fjerne den første blomst, der kommer på planten. Hvis ikke den fjernes, hæmmes den fremtidige vækst meget og udbyttet mindskes.

**Høst:**

De grønne frugter smager vidunderligt og kan høstes. Måden hvorpå man afgør om frugten er moden, er at give den et lille klem. Hvis der kommer et lille smæld er frugten klar til høst. Hvis man ønsker at frugterne skal høstes røde, tager det betydeligt længere tid, og totalt set vil man få færre frugter på planten.

**Sygdomme og skadedyr:**

-*Giffelråd* ses ved at der kommer en rådden plet i frugtens spids. Griffelråd skyldes udtørring eller kalciummangel. Jævnlig vanding indeholdende 1 promille gødningsvand forebygger giffelråd.

-*Bladlus* er absolut peberplantens værste. Der er næsten 100% sikkerhed for at der kommer bladlus. Lusene kan ses med det blotte øje, og der kommer huller i bladene på planten. Når angrebet er sket, kan planten overbruses med vand, og der kan sprøjtes vand på planten under bladene. Hermed forsvinder mange lus. En anden mulighed er at indfange mariehøns, som udsættes på planten i drivhuset. De elsker bladlus, og får hurtigt sat skik på en koloni af bladlus. Faktisk bruges peberfrugt-planter i nogle drivhuse til at forhindre bladlus i andre planter fordi lusene foretrækker peberfrugt-planterne frem for andre planter.