

Dyrkningsvejledning for: Pluk Salat



Latinsk navn: *Lactuca sativa var. crispata*

"Der findes en hel del forskellige sorter af pluksalat med forskellige bladformer og farver, så der er rig mulighed for at få et smukt salatbed som pynter i haven, samtidig med at der kan spise af pynten."

Jord:

Salat foretrækker en muldholdig jord der holder godt på vandet. De fleste grøntsager dyrkes bedst i fuld sol, men har du muligheden får du faktisk en bedre salat hvis du dyrker den i halvskygge frem for i sol. Den ideelle pH værdi er 6,8-7,5.

Forkultivering:

Kan sås fra midten af marts på overfladen af pottemuld og dækkes med 1 cm fin jord. Der vandes forsigtigt så frøene ikke skylles rundt. Potterne sættes til spiring et lunt men ikke for varmt (under 20 grader), pluksalat kan have svært at spire hvis det er for varmt. Der er mange forskellige sorter af pluksalat, nogle sorter egner sig til såning i det tidlige forår, mens andre er bedre at bruge senere på året. Forkultivering og udplantning af pluksalat er mest effektivt midt på sommeren da man kan have problemer med spiring i varmen.

Udplantning:

Vand salatplanterne en time før de skal plantes ud, tag dem ud af potterne og vær forsigtig med ikke at beskadige rødderne. Planterne sættes ikke dybere i jorden end de stod i potterne. Fyld jord omkring rødderne og tryk den til for at sikrere god jordkontakt og støtte til de nye planter. Der skal være 10 cm afstand mellem planterne og ca. 20 cm mellem rækkerne. Der skal vandes grundigt efter udplantning og i etableringsfasen skal der vandes hver anden dag indtil planterne er gået i vækst igen.

Direkte udsåning:

Så i april til juni i flere omgange. Frøene sås direkte på jorden og dækkes med et tyndt lag jord. Frøene vil normalt spirer efter 5-10 dage. Hvis du ønsker at så salat midt på sommeren (over 20 grader), kan det være en ide at så et mere køligt sted i skyggen.

Pleje:

Vanding er alfa og omega for at få succes med salat. Hvis planterne tørrer ud bliver smagen hurtigt bitter, og du risikerer at væksten går helt i stå.

Høst:

Pluksalat kan høstes løbende ved at tage nogle enkelte blade fra hver plante så planten kan vokse videre.

Sygdomme og skadedyr:

-*Svampe*: De væsentligste plager for salat er svampesygdommene som feks salatskimmel, rodtiltsvamp, gråskimmel, storknoldet knoldbægersvamp. Salatskimmel må betragtes som den alvorligste sygdom da blade kan visne helt væk og svampen kan udvikle sig yderligere efter høst. De første symptomer er enkelte hvidlige pletter oftest på undersiden af de ældste blade. Efterhånden udvikles hvide-gule pletter der senere bliver brune. På undersiden af pletterne ses kraftige belægninger af svampens sporer. For at forebygge salatskimmel kan man vælge skimmelresistente sorter. Desuden skal man sørge for god luftcirkulation omkring planterne, man skal sørge for at fjerne angrebne planter fra haven og man skal tænke på at man kan sprede svampesporer med handsker, fodtøj og redskaber.