

## Dyrkningsvejledning for rødkål



Latinsk navn: *Brassica oleracea* var. *capitata*

*"Rødkål hører ligesom de øvrige kålarter til de korsblomstrede. Det er en toårig plante, som udelukkende dyrkes som etårig. Rødkål er en relativ dyrkningssikker plante hvis største problem er de mange skadedyr som angriber kålplanterne".*

### Jord:

Rødkål kan dyrkes på alle jorde, blot der er en god forsyning med næringsstoffer og vand. Disse krav opfyldes bedst på en lerholdig jord. Det er en fordel at forberede pladsen hvor rødkålen skal stå med et lag kompost eller beriget spagnum. Det danske klima egner sig godt til rødkål. Det må gerne være blæsende for at undgå store skadedyrsangreb. Da kål optager en masse næringsstoffer for at udvikle store hoveder, skal det såkaldte reaktionstal være ret højt. Det vil sige at man skal kalke jorden lidt inden udplantning eller udsåning, men ikke for meget - et for højt reaktionstal øger risikoen for kålbrot.

### Forkultivering:

Rødkål sås indendørs i koldhus i april og de plantes ud når frosten er ovre. Så 2-3 frø i en 9 cm potte. Forkultivering giver mulighed for at holde dine planter under opsyn og forhindre at de blive gnavet ned af skadedyr. Kimplanterne er særlig følsomme for angreb af snegle som kan æde hele planter på en enkelt nat.

### Udplantning:

Den sidste uge før udplantning afhærdes planterne på en plads med læ i det fri. Planterne sættes på friland i maj til juni. Udplantning kan også ske fra begyndelsen af april, hvis man ønsker et meget tidligt hold sommerkål, men så skal planterne dækkes med fiberdug for at beskytte mod kulde og frost.

### Direkte udsåning:

På friland sås fra midt i april. Man sår 3-4 frø, hvor man ønsker én blivende plante. Der skal være 45-50 cm mellem planterne og 50 cm mellem rækkerne. Den direkte såning giver risiko for, at kimplanterne ødelægges af forskellige skadedyr som jordlopper eller snegle. Hvis man er plaget af disse er det bedre at forkultivere og udplante og samtidig udlægge et godt lag jorddække.

### Pleje:

Husk at kål har brug for gødning og i hele vækstperioden. Hvis rødkålen tørkestresses i vækstperioden bliver hovederne små. Læg evt. lidt flis, kompost eller fiberdug omkring rodstængelen for at undgå angreb af kålfluen og for at hold jorden fugtig nedeunder. Hvis kålene angribes for hårdt af kålsommerfuglens larver bør de simpelthen fjernes.

**Høst:**

Kålhovederne kan holde sig længe og de høstes typisk i det sene efterår hvor det er koldt i vejret, men inde det sætter ind med hård frost, cirka når nattemperaturen når minus 2 grader.

**Sygdomme:**

-*Kålbrot* er den største risiko ved rødkåls dyrkning, dette kan forbygges ved at holde et godt sædskifte. Der skal gå 5 – 6 år mellem hver gang man dyrker kål samme sted, og det betyder at man i en lille have må undvære at dyrke rødkål ind i mellem.

-*Kålsommerfuglen* finder på at lægge sine æg i rødkålen. Man kan forebygge en del ved at plante duftende blomster omkring den, fx tagetes, sætte redekasser op til småfuglene, og simpelthen gå ud og fjerne æg og laver med fingrene. Man kan også dyrke under net, men så skal de være effektive og tætte.