

Dyrkningsvejledning for vandmelon



Latinsk navn: *Citrulus lanatus*

"Her er en opgave for dem der har mod på noget anderledes, vandmelon. Det kræver held (lang sommer), dygtighed og plads at kunne høste sine egne vandmeloner. Der går 8 uger fra frøet er spiret til planten blomstrer, og 8 uger med frugtmodningen. Det anbefales at så omkring 5 maj, udplantning og bestøvning ca. 1. Juni og høst først i august. Da planten kræver at både luft- og jordtemperaturen er mindst 20 grader, kan den tidligst komme i kold drivhus omkring 1.juni, hvilket vil sige at en stor del af den vegetative fase skal foregå i vindueskarmen eller et tilsvarende sted med kunstigt høj temperatur og gode lysforhold. En opvarmet havestue er et godt bud på et dyrkningssted".

Jord:

En godt drænet jord med sand og organisk materiale i form af f.eks. kompost. Jorden kan med fordel afdækkes med plast et par uger inden udplantning for at varme den et par grader op.

Forkultivering:

Start ikke dine planter før i starten af maj. Frøene sås i en god porrøs pottemuld som vandes let op. Undgå at overvande da dette kan udløse svampeangreb på de spirende frø så de rådner op. I såkasser eller potter sættes 2-4 frø, der overdækkes med plast eller bagepapir og de stilles lyst og lunt ved 20 grader. Efter fremkomsten af de to første rigtige blade (efter kimbladene) luges de svage individer ud. De resterende planter kan evt prikles om til potter med en i hver. Vandmeloner klarer sig dårligt hvis de skal stå i såkasser for længe (max 3-4 uger).

Udplantning:

Planten kan komme ud på friland eller drivhus når nattemperaturen ikke kommer under 13 grader længere, dvs. omkring 1. juni. Det gælder om at finde en lun plads med læ og fuld sol. Planteafstanden skal være omkring 2 m x 2 m. I tilfælde af en kølig periode efter udplantningen kan planterne overdækkes med fiberdug eller ståltrådsbuer med klar plast.

Pleje:

Hvis du vil sikre dig at dine planter bliver bestøvet kan de hjælpes lidt på vej ved overføre pollen fra hanblomsterne til hunblomsterne. Da planten ikke kan bære de modne frugter, bindes rankerne ikke op som andre typer af meloner, men får lov at ligge på jorden ligesom græskar. Man kan dog beskytte de voksende meloner ved at placerer et stykke pap eller andet materiale under frugten. Planterne vandes ofte men lidt så jordoverfladen når at tørre indimellem. Et jorddække kan reducere behovet for vanding. Når planten

begynder at blomstre og sætte frugt skal vandingen reduceres en smule, hvis de får for meget vand kan melonerne blive hule.

Høst:

Meloner er høstklar når de har fuld størrelse, anlægsfladen mod jorden bliver gul og vedhæftningen til melonen bliver brun, samt at melonen bliver mat i skindet. Hold skarpt øje med melonerne, da både for tidlig og for sen høst forringer smagen, på samme måde som for andre typer af meloner.